

Burgerstein Geriatrikum

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Was ist Burgerstein Geriatrikum und wann wird es angewendet?

Burgerstein Geriatrikum enthält Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sowie Ginsengextrakt zur Verbesserung der verminderten körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Burgerstein Geriatrikum eignet sich als allgemeines Stärkungsmittel für ältere Personen, zum Beispiel während der Genesung, bei Müdigkeit, Energielosigkeit, Erschöpfung, bei einseitiger und ungenügender Ernährung, bei Kauschwierigkeiten, Nahrungsverwertungsstörungen.

Wann darf Burgerstein Geriatrikum nicht angewendet werden?

Sie dürfen Burgerstein TopVital nicht einnehmen bei Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe, wenn bereits eine Überversorgung mit Vitamin A oder D besteht (eine sogenannte Hypervitaminose), wenn Sie andere Vitamin A- oder D-haltige Arzneimittel einnehmen, wenn Sie an eingeschränkter Nierenfunktion leiden oder wenn Sie mit Retinoiden (z.B. gegen Akne) behandelt werden.

Wann ist bei der Einnahme von Burgerstein Geriatrikum Vorsicht geboten?

Nicht während längerer Zeit in einer höheren als der empfohlenen Dosierung einnehmen. Burgerstein Geriatrikum soll wegen des Gehaltes an p-Aminobenzoesäure nicht gleichzeitig mit Sulfonamiden eingenommen werden. Hinweis für Diabetikerinnen und Diabetiker: Ginseng kann den Blutzucker-Spiegel senken. Eine Wechselwirkung von Ginseng mit Arzneimitteln, welche die Blutgerinnung hemmen (sogenannte Antikoagulantien, insbesondere Cumarine) kann nicht ausgeschlossen werden. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) anwenden!

Darf Burgerstein Geriatrikum während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

In einer Menge, die dem täglichen Bedarf entspricht, dürfen Sie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente einnehmen. Bei Tagesdosen, wie sie mit Burgerstein Geriatrikum zugeführt werden, sollten Sie dieses Arzneimittel jedoch nur nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin einnehmen. Burgerstein Geriatrikum enthält unter anderem Vitamin A. Es ist zu berücksichtigen, dass mit einer ausgewogenen Ernährung der Tagesbedarf an Vitamin A (enthalten z.B. in Leber, leberhaltigen Erzeugnissen, Milch, Milchprodukten, Margarine, Eier, Speiseöl) gedeckt bzw. sogar überschritten wird. Dies bei Leber und allenfalls bei leberhaltigen Erzeugnissen. Es wurde festgestellt, dass das Risiko gewisser Missbildungen bei Neugeborenen mit der täglichen Einnahme von hohen Vitamin A-Dosen während der Schwangerschaft ansteigt. Beim Verzehr von grossen Mengen Vitamin-A-haltiger Lebensmittel soll die gleichzeitige Einnahme von Burgerstein Geriatrikum vermieden werden. Beim Verzehr von Leber darf Burgerstein Geriatrikum nicht eingenommen werden.

Wie verwenden Sie Burgerstein Geriatrikum?

Erwachsene: Täglich 1 Kapsel nach einer Hauptmahlzeit. Behalten Sie die Kapsel mit etwas Flüssigkeit einige Sekunden im Mund und Sie werden sie leicht schlucken können. Die Dosierung kann auch auf 2 Kapseln pro Tag erhöht werden. Es ist empfehlenswert, Burgerstein Geriatrikum während einigen Monaten einzunehmen. Burgerstein Geriatrikum ist nicht zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen bestimmt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Burgerstein Geriatrikum haben?

Bei Einnahme von Burgerstein Geriatrikum kann in seltenen Fällen Übelkeit und Erbrechen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Burgerstein Geriatrikum ist ausser Reichweite von Kindern sowie gut verschlossen, trocken und bei Raumtemperatur zwischen 15-25°C aufzubewahren. Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp» bezeichneten Datum verwendet werden. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Burgerstein Geriatrikum enthalten

1 Kapsel enthält:

Vitamin A	4000 I.E.
Vitamin D3	400 I.E.
Vitamin E	50 I.E.
Vitamin B1	3 mg
Vitamin B2	3 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	12 µg
Calciumpantothenat	16,3 mg
Folsäure	0,4 mg
Nicotinamid	15 mg
Vitamin C (Calciumascorbat)	100 mg
Cholin	40 mg
Biotin	0,3 mg
p-Aminobenzoesäure	15 mg
Inositol	40 mg
Ginsengextrakt	100 mg
mit 3,4 mg Ginsenosiden	
Intrinsicfaktor	12 µg
Molybdän	100 µg



Kupfer	1 mg
Mangan	3 mg
Zink	8 mg
Magnesium	35 mg
Eisen	5 mg
Selen	50 µg
Calcium	70 mg
Phosphor	25 mg
Hilfsstoffe: Ethylvanillin, Excip. pro caps.	

Wo erhalten Sie Burgerstein Geriatrikum?

Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.
Packungen zu 40 und 100 Kapseln.

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2006 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.