

Burgerstein Vitamin B6 100 mg

**Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.**

Was ist Burgerstein Vitamin B6 100 mg und wann wird es angewendet?

Vitamin B6 ist eine lebensnotwendige Substanz, die der Körper über die Nahrung zuführen muss. Burgerstein Vitamin B6 100 mg wird eingesetzt bei Vitamin B6-Mangel, der folgende Ursachen haben kann: Erhöhter Bedarf durch regelmässige Einnahme der Antibaby-Pille sowie Arzneimittel wie gewisse Tuberkulosemittel und Penicillamin, welche die Wirkung von Vitamin B6 abschwächen. Vitamin B6-Mangel kann zu Haut- und Schleimhautveränderungen führen. In schweren Fällen können auch Blutarmut und Gehirnkämpfe beobachtet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Burgerstein Vitamin B6 100 mg gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann darf Burgerstein Vitamin B6 100 mg nicht angewendet werden?

Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Vitamin B6 sowie Patienten, die unter der Parkinsonschen Krankheit leiden und mit L-Dopa behandelt werden, sollen auf eine Einnahme von Burgerstein Vitamin B6 100 mg verzichten.

Wann ist bei der Einnahme von Burgerstein Vitamin B6 100 mg Vorsicht geboten?

Vitamin B6 kann die krampflösende Wirkung von Arzneimitteln, die bei Epilepsien verordnet werden (Barbiturate, Phenytoin) sowie die Wirkung von L-Dopa, das für Parkinson-Patienten verwendet wird, herabsetzen. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn

Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) anwenden!

Darf Burgerstein Vitamin B6 100 mg während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder Apotheker bzw. die Ärztin oder Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Burgerstein Vitamin B6 100 mg?

Erwachsene:

1 Tablette Burgerstein Vitamin B6 100 mg unzerkaut mit einer Flüssigkeit einnehmen, sofern vom Arzt nicht anders verordnet. Die Anwendung und Sicherheit bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht systematisch geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Burgerstein Vitamin B6 100 mg haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Burgerstein Vitamin B6 100 mg auftreten: Bei der Einnahme von mehr als 500 mg Vitamin B6 pro Tag während mehrerer Wochen bis Monate sind Störungen von Nervenfunktionen sowie der Bewegungskoordination beobachtet worden. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp» bezeichneten Datum verwendet werden.

Ausserhalb der Reichweite von Kindern und bei Raumtemperatur (15-25°C) aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Burgerstein Vitamin B6 100 mg enthalten?

Jede Tablette enthält 100 mg Vitamin B6.

Wo erhalten Sie Burgerstein Vitamin B6 100 mg? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung. Packungen zu 100 Tabletten.

Diese Packungsbeilage wurde im April 2005 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.



Zulassungsnummer: 47054 (Swissmedic). Abgabekategorie: C.