

Burgerstein Zinkglukonat 30 mg

**Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.**

Was ist Burgerstein Zinkglukonat und wann wird es angewendet?

Auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin. Zink ist ein für den menschlichen Körper wichtiges, lebensnotwendiges Spurenelement. Bei einem Zinkmangel können folgende Symptome beobachtet werden: Schuppige Hautkrankheiten, Haarausfall, verzögerte Wundheilung (z.B. beim Diabetiker), gestörte Geschmacks- und Geruchsempfindung, Hornhauttrübungen, Anfälligkeit gegenüber Infektionen, Teilnahmslosigkeit, Unterfunktion der Geschlechtsorgane (Hoden, Eierstöcke), verzögerte körperliche Entwicklung. Zinkmangel kann wegen einseitiger oder ungenügender Ernährung oder wegen eines erhöhten Bedarfes wie beispielsweise nach Operationen, Verletzungen, Verbrennungen, Schwangerschaft und Stillzeit entstehen. Auch erhöhte Zinkverluste des Körpers, die durch gewisse Arzneimittel ausgelöst werden können, oder eine ungenügende Zinkverwertung (z.B. bei Darmerkrankungen, Leberzirrhose) können zu Zinkmangel führen.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Burgerstein Zinkglukonat gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Burgerstein Zinkglukonat nicht angewendet werden?

Burgerstein Zinkglukonat darf bei Überempfindlichkeit auf den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe, schweren Nierenfunktionsstörungen oder akutem Nierenversagen nicht eingenommen werden.

Wann ist bei der Einnahme von Burgerstein Zinkglukonat Vorsicht geboten?

Durch Zinkzufuhr kann die Aufnahme anderer Spurenelemente beeinträchtigt werden. So kann es zu einer verminderten Kupferaufnahme, einer Ausbildung eines niedrigen Kupferblutspiegels sowie zu Eisenresorptionsstörungen kommen. Zink kann die Aufnahme einer bestimmten Antibiotika-Gruppe (Tetrazykline) beeinträchtigen. Die Einnahme dieser Antibiotika sollte deshalb vor oder mindestens 5 Stunden nach der Einnahme von Burgerstein Zinkglukonat erfolgen. Da die Aufnahme von Zink durch calcium- und phosphorhaltige Präparate sowie durch Kaffee und Vollkornprodukte vermindert wird, ist dem Hinweis, dass Burgerstein Zinkglukonat entweder 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach dem Essen eingenommen werden soll, Beachtung zu schenken. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) anwenden!

Darf Burgerstein Zinkglukonat während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Burgerstein Zinkglukonat darf während einer Schwangerschaft oder während der Stillzeit eingenommen werden, in der vom Arzt oder der Ärztin verschriebenen Dosis.

Wie verwenden Sie Burgerstein Zinkglukonat?

Erwachsene: Der Arzt oder die Ärztin wird aufgrund der jeweiligen Stoffwechselsituation die für Sie zutreffende Dosierung festlegen. Die Tabletten nehmen Sie unzerkaut 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach dem Essen mit einer Flüssigkeit ein.

Burgerstein Zinkglukonat ist nicht zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen bestimmt. Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu

stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Burgerstein Zinkglukonat haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme oder Anwendung von Burgerstein Zinkglukonat auftreten: In seltenen Fällen Sodbrennen, Erbrechen, Durchfall oder leichte Übelkeit.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp» bezeichneten Datum verwendet werden.

Burgerstein Zinkglukonat ist ausser Reichweite von Kindern sowie gut verschlossen, trocken und bei Raumtemperatur (15-25°C) aufzubewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in

Burgerstein Zinkglukonat enthalten?

Zinkglukonat ist eine organische Zinkverbindung. Burgerstein Zinkglukonat gibt es in der Dosierung von 30 mg Zink pro Tablette.

Wo erhalten Sie

Burgerstein Zinkglukonat?

Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packung: 100 Tabletten zu 30 mg.

Diese Packungsbeilage wurde im August 2007 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.



.....
Zulassungsnummer: 47133 (Swissmedic). Abgabekategorie: B.